

PILOSELLA
MINOR.

Weußörlin.

A ſuperne uirentibus, floribus luteis aut purpu
nuata. Ex qua deſcriptione ſole clarius ſit, eam
Latinis autem Auricula muris dicitur, non eſſe
neque maior neque minor Piloſella cœruleum
ut non parum errent herbarij noſtri temporis
auriculam appellari tradunt.

LOCVS.

Naſcitur utrunque genus locis montoſis &
uenitur etiam in aſperis & incultis agrorum lim

TEMPVS.

Maio & Iunio potiſsimũ menſe florent. Ma
tia Iunij menſis diſperit, & nuſquam ſubinde in

TEMPERAME

Eſſe calidas & ſiccas Piloſellas guſtus palàm
cum exigua quadam acrimonia coniunctam, ut
inde glutinanda uulnera ſint mirificè utiles.

VIRES EX RECE

Ferunt foliorum farinam uulnera mirum in
ſuccum exprimunt ad cohibendos quartanæ fe
diorum aciem, ut omne ferrum aliud domet, ſe
co cõmaduit tantam contrahere duritiam, tam
ut chalybis aciem reſpuat. Has certè omnes facu
Ioſellæ adſcribit. Recentiores huius herbæ radic
& in puluerem redactam, ac ſubinde potam, aut
B uerſus ramicem remedium tradunt.

DE PIMPINELLA

NOMINA.

VT appellata ſit Græcis aut Latinis he
bariorum & officinæ Pimpinellam
licuit. Sunt qui Pampinulam & Bipe
binellen & Bibernellen appellant.

GENERA.

Duûm eſt generum Pimpinella. Vna maior,
fariam ſciſsis, Siſaro haud diſsimilibus, caulibus a
guis & candidis. Altera minor, caulibus rufeſce
diſſectis multifariam, ſed ſerratis tantum, aliàs pr

FORMA.

Herba eſt folio mucronato, diſſecto, aut in ex
eadem radice binis aut trinis, anguloſis, & interd
mo naſcuntur flores minuti & candidi, & ijs deci
ſelini ſemini ſimile. Radice craſſa, longa, & ſubrul

LOCVS.

Lucis & opacis locis minus, in pratis autem m

TEMPVS.

Æſtate in autumnum uſque floret.

TEMPERAMENT

Quum acrimoniam non exiguam in guſtu pr
ordine calida & ſicca erit, imò ſecundum calefacie
eſt, & ad tertium ferè accedere.